

|             |    |   |      |                               |            |            |
|-------------|----|---|------|-------------------------------|------------|------------|
| 10.97x14.47 | 52 | 4 | עמוד | ידיעות אחרונות - זמנים בריאים | 21/02/2010 | 21594188-8 |
| 4030        |    |   |      |                               |            |            |

# בטיכול

**דוקטור, אצלי זה רק שאלה**

מומחים בתחומים שונים עונים לשאלות הקוראים

**מייר-לי גולן**

## נבתי יש נינים כבר שנים. חתי זה עובר?

**?** ראשה של חתי נת העשר מלא נינים כבר כמה שנים. לא עוזרים הטיפוי לים, המירוקים, התספורות הקצרה. יש תקופות של יותר נינים ותקופות עם פחות, אבל המסדר מלווה אותנו כבר תכונ זמן. האם יש גיל שבו הבטיה פשוט עוברת? האם הכינים לא מדיקות לבריאות?

**!** דייר אמיר חורב, בחלקת עזר ופון, המרכז הרפואי סרוקת: כיני הראש עלולות לפגוע בבני כל הגילים, אך במיוחד בבני גיל הילדות, מפני שרירי הטרנקה הנפוצה ביותר היא מגע ראש בראש שאופיינית לילדים. כרך בת העשר נמצאת במזרח הנגלים המוער ביותר להירבקות בכיני הראש. למעשה בין 15% ל-20% מכלל הילדים בגילים 4-13 בישראל נגועים בכיני הראש בכל זמן נתון.

הרבקה כה ממושכת, כמו זו שציגת, יכולה לנבוע מכמה סיבות: הדבקת חזרת מילדים נסביבה, עמידות הכינים לחומרי הרבחה, חומרי הרבחה לא יעילים וטכניקות טיפול או הנדחת שימוש שגויות. עלייד להמשיך לטפל בכיני הראש של חתך, כיוון שהן לא יעלמו בעצמן. חשוב לדעת שאין בשוק תבשיר שנטשמיד 100% מהכינים וביציתן, אך חשוב מאוד להקפיד על הוראות השימוש של כל תבשיר ותבשיר ולחזור על הטיפול לאחר עשרה ימים מהטיפול הראשון, כאשר כל הכינים בקצו מתוך הבינים. לאחר כל טיפול כזה יש לטרק את השיער במסרק צמת. בין הטיפולים מומלץ להדטיב את השערות ולסרקן עם מסרק כינים מדי יום כדי לסלק את הכינים שבקשו.

לגבי הקשר בין כיני הראש למחלות: אצנת: כיני הראש מעבירות את כל חיזק על רקפתו של האדם הנגוע וניווטת מדמו. הזסמין העיקרי של הרבקה הוא עקצוץ בקר-קפת, כשלעיתים ניתן לראות את סימני העקצוץ כעיקר באזור העדף. לעיתים נדירות בלבי פעולה הגרוד באזור העקצוץ עלולה לגרום לידהום ודייקי משני, עם הפעת נגעים מוגלתיים, חום גבה הגדלה של קשריית ליספה אזוריית.